12. Deutsches GeoForum

07.11.2024 – 08.11.2024

Generalisierung von neuronalen Netzwerken zur deutschlandweiten Vorhersage von Vegetationsindikatoren im urbanen Bereich unter Verwendung von Sentinel-2

Gliederung

1. Einleitung

2. Vegetationsindikatoren auf Grundlage von Sentinel-2

3. Generalisierung des Modells

4. Ausblick

Einleitung

Einleitung

Projektpartner:

Luftbild Umwelt Planung GmbH, Potsdam
City Leipzig, Amt für Stadtgrün und Gewässer
TU Berlin, Institut für Ökologie

Zeitraum:

01/2022 to 12/2025

Praxispartner:

Gütersloh, Hamburg, Stuttgart, Potsdam, Duisburg,
Augsburg, Würzburg, Essen, ...

Gefördert:

Bundesministerium für Digitales und Verkehr (BMDV)

Einleitung

Vegetationsindikatoren:

- **Beschirmungsgrad:** wie viel Prozent der Stadtfläche ist beschirmt?
- **Vegetationshöhe:** wie hoch ist die Vegetation?
- **Grünvolumen:** wie viel Volumen nimmt die Vegetation ein?

Relevanz für Stadtklima:

- **Kühlung** durch Evapotranspiration
- **Hitzekomfort** durch Beschattung
- **Verbesserung** Luftqualität & Lärm

Quelle: Großmann et al. 1983

Einleitung

Welche Daten zur Modellierung von Vegetationsindikatoren?

Einleitung

Deutschlandweite Referenzdatensammlung

Räumliches KI-Modell (CNN) to generate more reference data

~ 0.5 m

Upscaling

Zeitreihen KI-Modell (Transformer) for annual indicator prediction

~ 10 m

Deutschlandweite jährliche Indikatorvorhersage

Einleitung

Wie gut generalisiert das Modell:

- für unabhängige Gebiete?
- für unabhängige Jahre?

**Zeitreihen KI-Modell
(Transformer)**
for annual indicator prediction

~ 10 m

**Deutschlandweite jährliche
Indikatorvorhersage**

Vegetationsindikatoren auf Grundlage von Sentinel-2

Vegetationsindikatoren auf Grundlage von Sentinel-2

Referenzdatensammlung

Year	City
2018	Leipzig
	Saalfeld
	Solingen
2019	Bielefeld
	Magdeburg
2020	Berlin
	Dresden
	Guetersloh
	Marburg
	Vechta
2021	Darmstadt
	Frankfurt
	Hanau
2022	Augsburg
	Potsdam

Year	City
2018	Duisburg
	Essen
2020	Duisburg
	Essen
2022	Duisburg
	Essen

Modell

- Sentinel-2 Zeitreihe (3 Jahre, FORCE)
- Transformer Encoder (Irreguläre Zeitreihenklassifikation)

Rußwurm, M., & Körner, M. (2020). Self-attention for raw optical satellite time series classification. *ISPRS journal of photogrammetry and remote sensing*, 169, 421-435.

Vegetationsindikatoren auf Grundlage von Sentinel-2

Modell

- Sentinel-2 Zeitreihe (3 Jahre, FORCE)
- Transformer Encoder (Irreguläre Zeitreihenklassifikation)

Rußwurm, M., & Körner, M. (2020). Self-attention for raw optical satellite time series classification. *ISPRS journal of photogrammetry and remote sensing*, 169, 421-435.

Generalisierung des Modells

Generalisierung des Modells

Sentinel-2 Zeitreihe *Laubbaum*

Einfluss auf Spektralsignal von Vegetation

- Datenabdeckung variiert je nach Wolkenbedeckung
- Meteorologie variiert räumlich und jährlich
- beeinflusst Beginn, Ende und Intensität von Vegetationsperioden
- hoher Einfluss auf Vorhersage von Vegetationsindikatoren mit Sentinel-2
- ...

Generalisierung des Modells

Thermale Zeit¹

31.08.2024

Time Series Augmentation^{2,3} Day Shifting & Annual Scaling & Zero Out

Scaling

¹Nyborg, J., Pelletier, C., & Assent, I. (2022). Generalized classification of satellite image time series with thermal positional encoding. In *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition* (pp. 1392-1402).
²Pham, V. D., Tetteh, G., Thiel, F., Erasmi, S., Schwieder, M., Frantz, D., & van der Linden, S. (2024). Temporally transferable crop mapping with temporal encoding and deep learning augmentations. *International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation*, 129, 103867.
³Iwana, B. K., & Uchida, S. (2021). An empirical survey of data augmentation for time series classification with neural networks. *Plos one*, 16(7), e0254841.

Generalisierung des Modells

Zeitliche Generalisierung

Year	City
2018	Leipzig
	Saalfeld
	Solingen
2019	Bielefeld
	Magdeburg
2020	Berlin
	Dresden
	Guetersloh
	Marburg
	Vechta
2021	Darmstadt
	Frankfurt
	Hanau
2022	Augsburg
	Potsdam

Year	City
2018	Duisburg
	Essen
2020	Duisburg
	Essen
2022	Duisburg
	Essen

R²	0.66	0.77	0.73	0.79	0.73	0.81
RMSE	459.23	375.42	398.50	348.65	413.31	345.47

Generalisierung des Modells

Räumliche Generalisierung

- Vechta
- Marburg
- Gütersloh
- Gießen
- Dresden
- Berlin
- Other Cities

→
 hoch Entfernung zur nächstgelegenen Referenz niedrig

Ausblick

Ausblick

- **Satellite Image Foundation Models**

- Privthi¹
- Presto²

- **Genauigkeit von aggregierten Ergebnissen**

Change in Green Volume (2018 to 2022)

- -5 % bis -1,25 %
- -1,25 % bis -0,1%
- - 0,1% bis 0,1%
- 0,1% bis 1,25%
- 1,25% bis 5%

¹Jakubik, J., Roy, S., Phillips, C. E., Fraccaro, P., Godwin, D., Zadrozny, B., ... & Ramachandran, R. (2023). Foundation models for generalist geospatial artificial intelligence. *arXiv preprint arXiv:2310.18660*.

²Tseng, G., Cartuyvels, R., Zvonkov, I., Purohit, M., Rolnick, D., & Kerner, H. (2023). Lightweight, pre-trained transformers for remote sensing timeseries. *arXiv preprint arXiv:2304.14065*.

Kommunale Anwendung der Indikatoren

- WVO
- Maßnahmenkontrolle
- ...

Satellitenvorhersage: Veränderung Beschirmungsgrad 2018 auf 2022

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

benjamin.stoeckigt@lup-umwelt.de

www.lup-umwelt.de

We fully support Open Science

Data:

- Coming Soon -

Code:

<https://github.com/LUP-LuftbildUmweltPlanung/UNet>

https://github.com/LUP-LuftbildUmweltPlanung/SITS_classification